

Ueber die
Behandlung rachitischer Curvaturen.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

des

Herrn Geheimrat und Professor

DR. J. N. RITTER VON NUSSBAUM

k. b. Generalstabsarzt à l. s.

der

hohen medicinischen Fakultät zu München

vorgelegt

von

Otto Besnard,

approb. Arzt.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ueber die
Behandlung rachitischer Curvaturen.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

des

Herrn Geheimrat und Professor

DR. J. N. RITTER VON NUSSBAUM

k. b. Generalstabsarzt à l. s.

der

hohen medicinischen Fakultät zu München

vorgelegt

von

Otto Besnard,

approb. Arzt.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Seinem lieben Onkel

HERRN

Generalarzt Dr. A. Besnard

gewidmet

vom Verfasser.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Unter den verschiedenartigen Verkrümmungen am Skelette, mögen sie durch was immer für eine Urfache hervorgerufen sein, beanspruchen nicht in letzter Linie die der Rachitis ein spezielles chirurgisches Interesse.

Rachitische Verkrümmungen langer Röhrenknochen kommen sowohl an der oberen wie auch an der unteren Extremität vor, ja es sind Fälle bekannt, in denen der Oberarm in Folge einer Infraction winkelig einheilte. Bei ganz jungen Kindern kommen auch säbelförmige Verbiegungen der Oberarmknochen vor, doch sind derlei Fälle sehr selten und sind auch für die Dauer von wenig chirurgischen Interesse, da diese Curvaturen verhältnissmäßig rasch ausgeglichen werden und zwar noch regelmässig vor dem Zeitpunkte, wo das Kind einen selbstständigen Gebrauch seiner Arme zu machen beginnt. Anders liegen die Verhältnisse an den unteren Extremitäten. Es ist nicht feststehende Thatsache, dass der rachitische Prozess von unten nach oben fortschreite, und doch ist anderseits nicht zu läugnen, dass sowohl Thorax als Schädelknochen noch frei waren von den Spuren der Rachitis, während an der unteren Diaphyse der Tibia bereits Knorpelwucherungen zu entdecken waren, was dafür spricht, dass bei einem bereits rachitischen Kinde die unteren Extremitäten die hervorragendste Rolle spielen. Es möge hier bloß angedeutet werden, in welch' hohem Grade die bei rachitischen Kindern oft vorkommende veränderte Richtung

der Pfanne noch vorne und die daraus resultirende Stellungsveränderung des Femur auf die Configuration des Beckens und insbesondere des weiblichen Einflufs hat, mit der Bemerkung, dafs viele Scoliosen auf rachitischer Basis beruhend mit der Verbiegung der unteren Extremitäten in unzweifelhaftem Zusammenhange stehen dürften. Mit den Veränderungen am Thorax treten auch solche an den Organen in der Brusthöhle auf, da die Lunge nicht mehr im Stande ist, sich normal auszu dehnen. Dabei erleiden hauptsächlich die scharfen Ränder der Unterlappen einen sonderlichen Zustand. Die Lunge ist eingeklemmt zwischen Pleura cost. und Diaphragma, welches bei Rachitis verdickt sein soll; in Folge dieser Einklemmung sind bei der Inspiration gröfsere und kleinere Parthien der oben erwähnten Ränder für die Luft unzugänglich. Durch Obliteration der Gefäfsse wird das Gewebe anämisch, derb, schrumpft später zusammen. In Folge von Circulationsstörungen ausgehend vom Herzen oder den Lungen Hydrops, Ascites, Hydrothorax. Keinesfalls kann geläugnet werden, dafs die der Natur überlassenen rachitischen Verbiegungen den Schwerpunkt des Körpers und damit das Becken verschieben, möge das rachitische Becken entstanden sein, auf Grund der bekannten Consistenzveränderungen unter dem Einflufs der Rumpflast, oder auch auf differentem Wachsthum der einzelnen Beckenabschnitte beruhen. Durch die Krümmung der Oberschenkel gewöhnlich mit genu valgum combinirt, als auch durch die in verschiedenen Graden auftretende Curvatur der Unterschenkel und die Plattfussstellung wird das Gehen ohne Hülfe unmöglich, oder doch sehr erschwert.

Die rachitischen Curvaturen sind in der grofsen Mehrzahl der Fälle beiderseitig und symetrisch, seltener ist die Tibia der einen Seite anders gekrümmt, wie die der entgegengesetzten, oder ganz gerade geblieben. In Bezug auf die Form und die Art der Verkrümmungen herrscht allerdings die gröfste Verschiedenheit und Unregelmäfsigkeit, doch lassen sich immerhin zwei Haupttypen unterscheiden.

Bei der häufigsten Art der Curvatur ist die Tibia in toto bogenförmig verkrümmt und zwar ist dann meistens die Convexität des Bogens nach aussen gewandt. Da hiebei auch sehr oft die Femora nach aussen verkrümmt erscheinen, so erhält die ganze Extremität die Form der O oder der sogenannten Säbelbeine. So bedeutend die Verunstaltung der Extremitäten dadurch ist, so hochgradig die Verkrümmung der Cruva, so wird dieselbe doch nicht sehr häufig der Grund einer eingehenden Behandlung, da in den meisten Fällen diese Art von Curvaturen während des Scelettwachsthums sich so bessert, daß nur eine leichte Biegung des Knochens beim erwachsenen Menschen an die schwere Deformität erinnert, die das betreffende Individuum in seinen Kinderjahren aufzuweisen hatte, weshalb R. Volkmann mit Recht darauf aufmerksam macht, daß auf die große Anzahl krummbeiniger Kinder, die in Gegenden, wo die Rachitis zu Hause ist, herumwackeln, nur eine ganz kleine Anzahl krummbeiniger Erwachsener kommt. Jedoch wäre es fehlerhaft, wollte man bei derlei Formen vollständig von einer chirurgischen Behandlung absehen. Hier sind articulirte Schienenapparate sehr am Platze, wenn es auch fraglich ist, ob diese orthopädische Behandlung im Stande ist, die Deformitäten schneller zu heilen, so wird doch jedenfalls etwas erreicht werden, und das ist die Verhinderung der weiteren Zunahme der Verkrümmungen, die mit ziemlicher Sicherheit erfolgt. So praktisch und gefahrlos diese Behandlungsweise ist, so ist sie dennoch mit Uebelfänden verknüpft, die namentlich in der Armenpraxis, in der doch die meisten Fälle von Rachitis zu verzeichnen sind, schwer ins Gewicht fallen. Die Behandlung ist, wenn man wirklichen Nutzen davon haben will, ziemlich theuer, abgesehen davon, daß das lange fortgesetzte Tragen von Schienenapparaten von vielen Kindern gar nicht ertragen wird. In solchen Fällen, in denen äußerer Verhältnisse halber keine derartige Behandlung eintreten kann, muß man zur Osteotomie seine Zuflucht nehmen und man wird sich um so

leichter zu dieser Operation entschliessen, als durch die jetzigen Hilfsmittel diese Operation den gefährlichen Charakter verloren hat, und zudem auch die Behandlungsdauer wesentlich abgekürzt wird.

Die 2. Gruppe der rachitischen Unterschenkelverkrümmungen, und das dürfte wohl diejenige Art sein, die am meisten eines chirurgischen Eingriffes bedarf, ist die der scharfwinkligen Knickung, die häufig, beinahe immer einer Infractio, feltner einer Fractur ihre Entstehung verdankt. Diese Knickung hat hauptsächlich ihren Sitz dicht über dem Fussgelenk, obwohl sie an jeder beliebigen Stelle des Unterschenkels vorkommen kann. Hierbei ist der Scheitel des Winkels meistens nach aussen gerichtet, die Kinder treten dann mit dem äusseren Fußrande auf und in extremen Fällen berührt sogar beim Stehen und Gehen der Malleolus externus den Boden. Sollte die Spitze des Winkels nach der entgegengesetzten Seite gerichtet sein, was übrigens ein äusserst feltener Fall ist, so berührt dann der innere Fußrand den Boden. Noch eine dritte Form der winkligen Verbiegung kommt vor, und zwar in der Weise, daß die Tibia in der Richtung nach vorne eingeknickt ist, die Hacke erscheint dabei stark nach hinten verschoben und beim aufrechten Stehen und Gehen hat der Fuß eine stark dorsalflectirte Stellung. Daß alle diese scharfwinkligen Knickungen und namentlich solche, die dicht über dem Fussgelenk sich befinden, einen störenden Einfluß auf die Stellung des Fußes und insbesondere auf die Fußwurzelknochen ausüben und von größerem Interesse sind als die Curvaturen, die bogenförmig verlaufen, ist klar, da bei letzteren selten so hochgradige Behinderung beim Gehen vorhanden ist. Diese nun sind es, die hartnäckig jeder Schienenbehandlung trotzen und die dringend eines operativen Eingriffes bedürfen.

Die Methode der Behandlung ist jedoch abhängig, sowohl von dem Grade des Uebels, als auch von der Texturveränderung der erkrankten Knochen. Sind die Knochen noch so biegsam,

dafs die Kraft der Hände ausreichend ist, um die Biegung zu Verschwinden zu bringen, so wird dieselbe in der Narkose vorgenommen, und um den Knochen in der Stellung belassen zu können, ein fixirender Verband angelegt. Reactionen auf dieses Verfahren folgen selten und die Erfolge sind sehr schön. Ist der Knochen bereits hart, nicht sclerosirt und ist auch die Lage der Verkrümmung zur Hervorbringung eines künstlichen Knochenbruches günstig, so ist diese Art der Behandlung indicirt. Hier handelt es sich hauptsächlich durch die Zusammenheilung der künstlich getrennten Knochen die Deformität zu beseitigen, oder doch wenigstens so zu verbessern, dafs dem Patienten ein nennenswerther Vortheil zu Gute kommt. Dafs die künstlich erzeugte Fractur keine complicirte sein darf, ist selbstverständlich. Ob die durch Händekraft erzeugte Knochentrennung eine vollkommene ist, oder ob blofs eine Infractio, ist für den Heilungsprocefs von keinem grofsen Belange, da es einerseits nicht immer in der Hand des Operateurs liegt, anderseits wie oben bemerkt, wie bei der Biegung, so auch hier keine Reaction erfolgt.

Bis zu welchem Alter die rachitisch verkrümmten Knochen gebrochen werden können, ist schwer zu bestimmen; da die Festigkeit der Knochen verschiedenen Schwankungen unterliegt, und sollte bereits Sclerisirung, die gewöhnliche Texturveränderung bei Rachitis, eingetreten sein, so ist an eine Brechung der Knochen mit den Händen, auch bei ganz kleinen Kindern kaum mehr zu denken. Deshalb hat man schon in frühen Zeiten, zwar wohl weniger zum Zwecke rachitisch verkrümmter Knochen, als grösstentheils zum Wiederbrechen schlecht geheilter Fracturen zu mechanischen Hilfsmitteln gegriffen. Schon Hippocrates hielt das Wiederabbrechen kaum geheilter Fracturen für möglich und im Interesse des Kranken. Es findet sich bei ihm folgende Stelle: »Utilius fuerit, ut si quis male curandus sit ambo potius crura fracta habeat, quam alterum tantum.«

Wie jedoch diese Operation geschah, davon findet sich keine Andeutung, sicher wurde jedoch der künstliche Knochenbruch von Celsus und Galenus ausgeübt. Erst Rizzoli kam auf die geistreiche Idee, seinen Osteoclasten zu orthopädischen Zwecken zu verwenden und wir sind dadurch in den Stand gesetzt, mit diesem Apparate bedeutende Kraft zu entwickeln, vorausgesetzt, daß die Verkrümmung günstige Momente zur Anlegung des Osteoclasten darbietet. Die Anwendungsweise ist eine sehr einfache.

Von vielen Seiten wurde entgegengehalten, daß durch den Druck, den der Stahlbogen auf die Weichtheile ausübt, eine starke Verletzung derselben hervorgerufen wird. Diese Furcht ist jedoch unbegründet, indem die Elasticität der kindlichen Haut und der durch die rasche Handhabung des Apparates beinahe nur momentan wirkende Druck jede Mortification der Gewebe vermeidet. Am leichtesten wäre Gangrän möglich über der kammartig vorspringenden und bereits gewöhnlich sclerosirten Crista tibiae. Kleine Sugillationen und Hautabschilferungen dürften öfters vorkommen, doch sind dieselben absolut von keinem Belang. Auf der hiesigen chirurgischen Klinik wurden von Herrn Geheimrath Professor Dr. v. Nussbaum eine große Anzahl solcher Operationen vorgenommen, doch ist es in keinem Falle zu Abscedirung oder Excoriation, geschweige zu Gangrän und tiefer Mortification der Gewebe gekommen. Leider läßt sich der Rizzoli-Apparat nicht in allen Fällen von rachitischen Verkrümmungen anwenden, indem oft sowohl durch die tiefe Lage der Verkrümmung zur Application des Instrumentes kein günstiger Raum geboten wird, als auch dadurch, daß bei Erwachsenen durch die rachitische Sclerose oder Eburneation genannt, die Knochen eine solche Festigkeit erlangen, daß sie selbst hochgradigen Gewalteinwirkungen widerstehen. Es ist bekannt, daß, sobald der rachitische Prozeß erlischt, nicht nur eine vollständige Verknöcherung der von der Knorpelfuge und vom Periost im Ueberschuß vorgebildeter

Elemente zu Stande kommt, sondern auch, daß die erkrankt gewesenen Knochen meist besonders fest werden.

In einem solchen Falle bleibt nun weiter nichts mehr übrig, als auf blutigem Wege die Knochen zu durchtrennen, d. h. eine Osteotomie zu machen.

Die Osteotomie ist keine Erfindung der Neuzeit, indem schon Paul von Aegina mit dem Meißel die Knochen durchtrennte. Im Jahre 1850 osteotomirte A. Mayer in Würzburg zwar mit ausgezeichnetem Erfolge, doch fand diese seine Operation keine weitere Verbreitung, da in Folge der ausgedehnten Weichtheilverletzungen und dem daraus resultirenden Eiterungsprozeß in und um den Knochen das Leben der Kranken in direkte Gefahr versetzt wurde. Auch amerikanische Aerzte (Du Rea Baston, Rodgers und Kearney) beschäftigten sich viel mit Osteotomien, doch gelang es erst dem genialen Geiste Excellenz B. v. Langenbeck die früher so bedeutenden Weichtheilverletzungen zu eliminiren und so die offene Osteotomie zu einer subcutanen zu verwandeln, und doch hatte diese Osteotomie, da Langenbeck den Knochen mit Bohrer und Stichfäße verdünnte, einen Uebelstand, daß nämlich durch die zurückgelassenen Knochenspähne Eiterung verursacht wurde. Erst jüngere Chirurgen haben durch die Einführung des Meißels in die Operationstechnik die Osteotomie zu einer wirklich subcutanen umgestaltet.

Seit der Einführung der antiseptischen Wundbehandlung kann man wohl behaupten, daß die Osteotomie unter correct durchgeführter antiseptischer Behandlung ein vollkommen gefahrloser Eingriff ist, und man soll sich deshalb nie scheuen, bei hochgradigen winkligen Knickungen und bogenförmigen Krümmungen, die dem Osteoclasten schwer oder nicht mehr zugänglich sind, die Osteotomie auszuführen.

Indem ich mir erlaube, am Schlusse kurz etliche Krankengeschichten anzuführen, will ich zunächst die Technik der

Meißel-Operation beschreiben, wie selbe von Billroth und wie selbe von v. Nussbaum geübt wird.

Nachdem von Billroth das Operationsfeld gründlich desinficirt worden und alle Instrumente, die zum Gebrauch kommen in 5% Carbolsäure gelegt sind, wird, nachdem die Narkose eingeleitet und das Toleranzstadium eingetreten ist, unter dem Carbolspray ein Schnitt in die Längsaxe der Tibia gemacht an der Stelle der stärksten Krümmung. Dieser Schnitt durchtrennt die Weichtheile bis auf den Knochen. Nachdem nun auch das Periost durchschnitten, wird es mittelst scharfer Raspatorien vom Knochen abgelöst. Um einer starken Zerrung des Periostes vorzubeugen, kann man an seinen beiden Enden zwei kleine Querschnitte hinzufügen. Ist nun der Knochen zugänglich und die etwaige Blutung durch Unterbindung mit Catgut gestillt, so beginnt die Durchtrennung des Knochens. Mit einem langen schmalen Meißel, der genau senkrecht auf die Oberfläche der Tibia aufgesetzt wird, sucht man mittelst kurzer Schläge durch die obersten Lagen der Substantia compacta hindurchzukommen. Ist nun dies gelungen, was oft ziemlichen Kraftaufwand erfordert, da es sich meistens um eine starke Sclerofirung handelt und dringt man in die Spongiosa ein, so findet der Meißel weniger Widerstand. Ist man nun soweit gekommen, daß man auf die gegenüberliegende Rinde gelangt, was an dem stärkeren Widerstande sofort zu erkennen ist, so entfernt man den Meißel mittelst hebelnder Bewegungen, um ein Abbrechen des Instrumentes zu verhindern. Von einer vollständigen Durchmeißelung muß schon deshalb abgesehen werden, da man die hinter dem Knochen gelegenen Weichtheile sehr leicht verletzen könnte, auch ist der Zweck der Operation erfüllt, indem die noch stehengebliebene Knochenbrücke leicht manuell durchbrochen werden kann. Eine Splitterung des Knochens wird bei einiger Vorsicht gerne vermieden und die etwa abgesprungenen Partikel müssen durch die Pincette oder den Irrigatorstrahl sorgfältig entfernt werden. Nachdem

nun der Knochen gebrochen, so stellt man die normale Form her, wie bei Reposition eines Bruches; auch bietet die Geraderichtung keine Schwierigkeiten. Die Wunde wird hierauf nochmals mit Carbol säure gereinigt, etwaige Knochensplitter entfernt, dann mit einigen Nähten verschlossen, darüber ein Nothverband aus Carbolgaze, der mit Bindentouren befestigt wird. Hierauf wird die Extremität in reducirter Stellung eingegypft. Nach Erhärtung des Verbandes wird ein Fenster entsprechend der Wunde ausgeschnitten und dann ein Lister-Verband angelegt.

Herr Geheimrath Professor Dr. v. Nufsbaum übt hingegen seit langer Zeit ein einfacheres Verfahren, das er bereits 26 Jahre in seinem orthopädischen Institute als recht gut und ungefährlich erprobte und für welches auch Excellenz v. Langenbeck sich sehr lobend aussprach, als er sich solche Operation in v. Nufsbaums Hand vor einigen Jahren im hiesigen Hauner'schen Kinderspitale selbst anfaß. Ein Verfahren, das die Sicherheit der antiseptischen Behandlung und dadurch auch den Erfolg in hohem Maasse erhöht.

Geheimrath v. Nufsbaum läßt nämlich, nachdem er einen diagonalen Hautschnitt auf die convexe Stelle der Tibia gemacht und auch das Periost einfach so durchschnitten hat, den Meißel auch in dieser diagonalen Richtung wirken und meißelt ungefähr $\frac{2}{3}$ der Tibia durch, ganz ebenso macht er es mit einem feineren Meißel an der Fibula, näht die Wunde mit Catgut, alles natürlich unter dem Spray und legt nun einen Lister'schen Gaze-Verband an. Da noch $\frac{1}{3}$ der Knochen steht und diese restirende Brücke gleichsam eine natürliche Schiene bildet, so nimmt v. Nufsbaum gar keinen Fixations-Verband, höchstens bei recht unruhigen Patienten eine Volkmann-Schiene. Erst nachdem die Wunde geheilt, was oft in überraschend kurzer Zeit erfolgt, bricht v. Nufsbaum die in Narkose noch stehende Knochenbrücke ab und gypft dann das Glied ein. Man hat hiedurch den Vortheil, jetzt eine einfache Fractur zu

haben und zur Zeit der Wundheilung noch gar keine Fractur gehabt zu haben.

Was den Verlauf der Operation betrifft, so ist bei dieser Behandlung unter mehr als 100 operirten Kindern noch nie ein Kind gestorben, in keinem Fall kam eine progrediente Entzündung, eine septische Phlegmone, ein Erysipel oder irgend eine andere accidentelle Wundkrankheit zur Beobachtung. Zu einer Eiterung der Bruchspalten ist es nie gekommen. Manchmal soll der Wundenlauf eine Störung durch Meißelnekrosen erhalten haben und so die Heilung etwas in die Länge gezogen worden sein, was ich selbst aber nach v. Nufsbaums Methode nie bedeutend beobachtete.

In der Mehrzahl der Fälle heilten die Wunden per primam und war das Allgemeinbefinden nicht gestört. Selten klagten die Kinder über Schmerzen, sie schliefen gut und blieben bei Appetit. Die Temperatur war allerdings in den ersten Tagen in vielen Fällen erhöht, doch bot die Wunde niemals Grund für die Steigerung und dürfte daher das Fieber als ein aseptisches Fieber zu betrachten sein. Der Verband wurde durchschnittlich am 2. oder 3. Tage zum ersten Male gewechselt, mit Ausnahme der Fälle, in denen der Verband verunreinigt war. Der zweite Verband wurde erst am 6.—8. Tage gewechselt und hier meistens die Nähte entfernt. Beim dritten Verbandwechsel konnte in der Mehrzahl der Fälle der zweite Act der Operation die Knochenbrechung vorgenommen werden und hierauf ein Gypsverband angelegt werden. Das Resultat war überall ein gutes zu nennen. Die Deformität war beseitigt, eine nachträgliche Verkrümmung wurde in keinem Falle beobachtet.

Ich erlaube mir nun 5 Fälle näher zu beschreiben, deren Pflege mir selbst anvertraut war.

I. Fall: Caroline H., $3\frac{1}{2}$ Jahre alt, wurde am 16. Mai ins Spital gebracht. Der Status praesens ergab eine bogenförmige mit der Convexität nach vorne gerichtete Curvatur in der Mitte

beider Unterschenkel. Das Gehen war fast gar nicht möglich, der Knochen jedoch sehr nachgiebig. Am 17. Mai wurde, nachdem das Kind in tiefe Narkose versetzt war, versucht, dem Knochen durch einfaches Biegen seine normale Stellung zu geben. Zu diesem Zwecke wurden die Knochen mit beiden Händen erfaßt und nach der Richtung der normalen Längsaxe soviel zurechtgebogen, als es dieser Fall erheischte. Das Redressement gelang vollständig, und dann an beiden Extremitäten ein Gypsverband angelegt. Das Kind erwachte aus der Narkose und klagte am selben Tage über leichte stechende Schmerzen, die jedoch durch kleine Gaben von Pulv. Dow. beseitigt wurden. Temperatur Abends $37,9^{\circ}\text{C}$. 3 Tage später wurde der Gypsverband entfernt, da derselbe etwas an den Malleolen drückte, und ein neuer angelegt. Das Kind befand sich bis zur endgültigen Entfernung des Verbandes am 25. Juni vollkommen wohl. Die Unterschenkel bekamen die gewünschte gerade Richtung und wurden zur Nachbehandlung Bäder und Einreibungen empfohlen. Als nach einem Jahre das Kind wieder vorgestellt wurde, war keine Recidive zu bemerken und soll das Kind nach Aussage der Eltern sehr rasch Gehen gelernt haben.

II. Fall: Joseph S., 3 Jahre alt. Curvatur beider Unterschenkel im unteren Dritttheil. In der Chloroformnarkose wurde am 16. April das Redressement versucht, allein es war nicht mehr möglich. Vermittelt Händekraft wurde eine künstliche Fractur hergestellt und ein fixirender Verband angelegt. Das Kind befand sich wohl, hatte jedoch am 1. und 2. Tage eine leichte Temperaturerhöhung von $38,3^{\circ}\text{C}$., später jedoch vollständig afebril. Am 25. Juni wurde der Verband entfernt. Beide Unterschenkel sind gerade. Das Kind ging anfangs etwas unbeholfen und schwerfällig, jedoch später ganz gut.

III. Fall: Bruno P., 3 Jahre 6 Monate alt. Verkrümmung beider Unterschenkel im unteren Dritttheil, dadurch das Gehen fast unmöglich geworden ist. Nachdem das Kind am 2. März

chloroformirt war, versuchte man zuerst das Redressement. Als dies nicht gelang, den künstlichen Knochenbruch, doch mit demselben Erfolg. Hierauf Anwendung von dem Rizzoli-Apparate. Mit hörbarem Krache brachen die Knochen an der gewünschten Stelle entzwei und wurden in einen fixirenden Verband gelegt. Das Kind fieberte am Abend desselben Tages etwas und klagte über Schmerzen. Jedoch schlief es Nachts und befand sich am andern Tage vollständig wohl. Das Resultat war ein ganz günstiges und ist die gerade Richtung der Beine auch beibehalten worden.

IV. Fall: Arthur N., $4\frac{3}{4}$ Jahre alt, leidet an schwerer Infractio beider Tibiae zwischen unterem und mittlerem Drittheil. Winkel nach einwärts offen und die Knochen sehr sclerofirt. Osteoclase mißlingt, in Folge dessen man am 5. Juli zur Osteotomie schreitet. Nachdem das Kind chloroformirt und das Operationsfeld tüchtig gereinigt war, wurde unter allen Lister-Cautelen die Operation beiderseitig vorgenommen, an der Tibial- und Fibularseite Incisionen gemacht und der Knochen nach v. Nufsbaums Methode diagonal bis zwei Drittheil durchgemeißelt. Die Wunden wurden hierauf mit einem starken Irrigatorstrahl ausgespült und mit Nähten vereinigt, darüber ein Lister-Verband in die Extremität auf eine Volkmann'sche Schiene gelegt. Das Kind erwachte aus der Narkose und klagte über brennende Schmerzen an beiden Füßen. Temperatur Abends $37,8^{\circ}$ C.

6. Juli: P. hatte Nachts gut geschlafen. Morgentemperatur $36,5$. Keinerlei Schmerzen.

8. Juli: Verbandwechsel; Entfernung der Nähte; die Wunden beider Extremitäten sind in vollständiger Heilung begriffen. Anlegung eines neuen Verbandes. Das Subjectivbefinden des Kindes normal.

14. Juli: Verbandwechsel. Die Wunde am linken Fusse vollständig geschlossen, bloß rechterseits ist die Heilung nicht vollständig. Borverband.

Am 15. Juli wird nun zum zweiten Theil der Operation, zur Brechung der Knochenbrücke, geschritten. Der linke Fuß wird fracturirt und in einen fixirenden Verband gelegt. Die Fracturirung des rechten Fußes wird, nachdem die äußere Wunde etwas langsamer als am linken Fuße geheilt war, 3 Tage später vorgenommen. Das Befinden des Knaben war während dieser Zeit ein ganz zufriedenstellendes. Nachdem nun beide Extremitäten mit Gypsverband versehen, wird P. am 21. Juli entlassen. Mitte September kam P. abermals ins Spital behufs Abnahme des Verbandes. Das Resultat war ein äußerst günstiges.

V. Fall: Martha K., $7\frac{1}{2}$ Jahre alt. Stark rachitische Curvatur beider Ober- und Unterschenkel. Die Oberschenkelkrümmung bildet eine Art Compensation für den Unterschenkelbogen; jedoch war letztere, weil sie zu bedeutend, als daß man ihn hätte lassen können. Doppelseitige Osteotomia tibiae et fibulae im oberen Dritttheil am 20. März. Antiseptischer Verband, dann später Gypsverband. Fieberfreier reactionsloser Verlauf. Am 9. April Operationswunde vollständig geheilt, während rechts eine ganz kleine Meißelnekrose den endgültigen Schluß der Wunde bis 12. August verhindert. Die Consolidation wurde links am 10. Mai, rechts am 15. Juni constatirt. Die Deformität wurde wesentlich gebessert; eine gänzliche Geradrichtung wäre hier gar nicht wünschenswerth gewesen, da eine gewisse Compensationsstellung des Unterschenkels wegen der Oberschenkelkrümmung nöthig war.

Schließlich sei es mir noch gestattet, an dieser Stelle meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrath Professor Dr. v. Nufsbaum, Generalstabsarzt a. l. s., für die gütige Ueberlassung der Arbeit meinen wärmsten Dank auszusprechen.

München, 14. April 1883.

